

| | |
|--|---|
| Název formuláře: Interpretace výsledků imunosupresiv, antimykotik Literatura |  Ústav hematologie a krevní transfuze |
| Název úseku: Oddělení biochemie | Identifikace: F_301_24_01 Platné od: 18.11.2024 Verze A1 |

Normální a kritické hodnoty hladin antimykotik a imunosupresiv byly stanoveny na základě níže uvedené literatury, doporučení lékařů a klinické farmaceutky ÚHKT.

- **Antimykotika:**

Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica. 2017;102:433–44.

The final recommendations of each group of ECIL 6 - TDM of antifungal drugs - final slide set https://www.ecil-leukaemia.com/images/resources/2015/5_ECIL6-Triazole-TDM-07-12-2015-Lewis-R-et-al.pdf

- **Imunosupresiva:**

Olaf Penack et al. Prophylaxis and management of graft versus host disease after stem-cell transplantation for haematological malignancies: updated consensus recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Lancet Haematol 2020; 7: e157–67. [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(19\)30256-X](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30256-X)

Przepiorka D, Devine S, Fay J, Uberti J, Wingard J. Practical considerations in the use of tacrolimus for allogeneic marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 1999 Nov;24(10):1053-6. doi: 10.1038/sj.bmt.1702032. PMID: 10578154.

Zpracoval: Ing. Alžběta Hlaváčková, Ph.D.

Dne: 18.11.2024