

LIDSKÉ PAPILLOMAVIRY (HPV) A KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU (CERVIXU)

ECCA chce přispět ke snížení výskytu karcinomu děložního čípku (cervixu) v Evropě především šířením informací o tomto onemocnění a o metodách, které mohou snížit jeho výskyt. Na základě odborných konzultací s vědeckými pracovníky, lékaři a veřejnými zdravotnickými organizacemi z celé Evropy připravila ECCA následující materiály:

Letáky

- Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku
- Lidské papillomaviry (HPV) a karcinom děložního čípku
- Sledování pacientek s abnormálním cytologickým nálezem

Brožury

- Vše, co potřebujete vědět, abyste se uchránila před karcinomem děložního čípku
- Vše, co potřebujete vědět, pokud máte abnormální cytologický stěr z děložního čípku

Pro získání dalších informací

- 📄 navštivte naši webovou stranu: www.ecca.fr
- ✉ pošlete Váš dotaz na: info@ecca.fr

terra@erdé Photos : Getty Image / Stockbyte

CZ_CZ_A0306

- Karcinom děložního čípku je vyvolán viry, které se nazývají lidské papillomaviry (HPV).
- HPV se nejčastěji přenášejí při sexuálním styku. Tyto viry jsou tak rozšířeny, že se s nimi většina dospělých sexuálně aktivních jedinců během života setká.
- Většina HPV infekcí není provázena žádnými příznaky a spontánně vymizí. U některých žen však HPV infekce přetrvává a právě tyto ženy mají zvýšené riziko vzniku karcinomu děložního čípku.

- Co způsobuje karcinom děložního čípku?
- Jak se nakazím genitálními HPV?
- Jak se můžu před infekcí chránit?
- Je možné genitální HPV infekci vyléčit?
- Bude mít HPV vliv na moje těhotenství?
- Co je HPV testace?

LIDSKÉ PAPILLOMAVIRY (HPV) A KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU (CERVIXU)




Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku



Co vyvolává karcinom děložního čípku?

Karcinom děložního čípku je vyvolán určitými typy lidských papillomavirů (HPV). Existuje více než 100 různých typů HPV a přibližně 40 z nich infikuje oblast genitální. Některé z těchto typů vyvolávají genitální bradavice, zatímco jiné typy vyvolávají změny buněk, z nichž se může vyvinout karcinom děložního čípku. Většina žen, které se infikují HPV, se této infekce během 6 až 24 měsíců zbaví bez jakýchkoliv komplikací. U některých žen však infekce HPV přetrvává a právě u těchto žen je zvýšené riziko vzniku karcinomu děložního čípku.



Lidský papillomavirus (HPV)

Jak se nakazím genitálními HPV?

Genitální HPV jsou obvykle přenášeny sexuální cestou, ale mohou být přeneseny z osoby na osobu při kontaktu kůže, ne pouze při sexuálním styku. Tyto viry jsou tak rozšířeny, že většina dospělých sexuálně aktivních jedinců se s nimi během života setká.

Karcinom děložního čípku vzniká na části dělohy, která je viditelná pochvou. Vzniká ze změněných cervikálních buněk, které se začnou nekontrolovaně množit. Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku má objevit časná stádia změněných buněk, které lze jednoduše odstranit a zabránit tak vzniku karcinomu. V současnosti je screening založen na vyšetření cytologického stěru z děložního čípku.

Screenované by měly být všechny ženy. Poprvé poté, co zahájily sexuální život a pak v pravidelných ročních intervalech bez omezení věku. Dnes je opakovaný screening prováděný v pravidelných intervalech nejlepší ochranou před vznikem karcinomu děložního čípku.

Jak se můžu před infekcí chránit?

I když jsou kondomy velmi účinnou ochranou před infekcí ostatními sexuálně přenosnými chorobami, nejsou až tak účinné při prevenci HPV infekce. Důvodem může být přítomnost HPV na kůži, která není kondomem chráněná.


Vakcíny, které by ochránily před HPV infekcí, jsou ve stádiu vývoje a dosavadní klinické zkoušky jsou velice úspěšné. Pokud další výsledky těchto klinických zkoušek budou stejně dobré, mohou se v blízké budoucnosti vakcíny stát efektivní cestou ochrany Vás a Vašich dětí před HPV infekcí.

Je možné genitální HPV infekci vyléčit?

Existuje léčba HPV infekcí, které vyvolávají genitální bradavice, ale nebylo zjištěno, že by tato léčba byla účinná v případě infekcí HPV typy, které vyvolávají karcinom děložního čípku. Naštěstí, většina infekcí spontánně vymizí za 6 až 24 měsíců bez jakýchkoliv komplikací.

Bude mít HPV vliv na moje těhotenství?

HPV, které vyvolávají karcinom děložního čípku, jsou velice rozšířené a není známo, že by měly jakýkoliv vliv na průběh těhotenství. Pokud jste infikována HPV, není důvod, abyste měnila Vaší předporodní péči.



Co je HPV testace?

HPV testace má za úkol zjistit, zda jste či nejste infikována HPV. I když v současnosti neexistuje léčba, která by vyléčila infekci HPV typy vyvolávajícími karcinom děložního čípku, určení přítomnosti HPV pomůže určit Vaše riziko vzniku onemocnění. Pokud nejste infikována HPV, Vaše riziko je velmi malé a je pro Vás bezpečný návrat do běžného screeningu. Pokud jste infikována HPV a infekce po čase spontánně nevyvizí, je zapotřebí provádět pečlivé sledování. Jeho účelem je zjistit, zda nemáte na děložním čípku změněné buňky, které je zapotřebí odstranit, aby se předešlo vzniku karcinomu.

Test lze provést na vzorku buněk z děložního čípku, které jsou odebrány stejným způsobem jako cytologický stěr. HPV testace může pomoci v prevenci karcinomu děložního čípku třemi způsoby:

- ve screeningu společně s cytologickým stěrem, či bez něj,
- při sledování žen s hraničními nebo mírnými cytologickými změnami, kde usnadňuje rozhodování o tom, zda má být pacientka léčena či nikoliv,
- při sledování žen po léčbě, kde usnadňuje rozhodnutí, zda léčba byla či nebyla úspěšná.

HPV testace je v naší republice běžně dostupná, ale provádí se pouze v určitých případech, dle rozhodnutí gynekologa. HPV testace není doporučena u žen mladších 30ti let. Důvodem je vysoký počet HPV pozitivních žen v této věkové skupině a zároveň skutečnost, že u nich HPV infekce obvykle spontánně vymizí bez jakýchkoliv komplikací.